

27歳ノトキ左側濕性肋膜炎ノ既往症アル58歳ノ男子ニ觀タル左側「ヒヨレステリン」性肋膜炎ニシテ、Cirrhose cardiaqueノ像ヲ呈シタル一症例ヲ記載ス。昭和11年4月上旬ヨリ惡心、嘔吐アリ、5月上旬全身倦怠感ヲ覺エ、鞏膜ノ黄染ヲ氣付カル。6月中旬ヨリ腹部膨隆シ始め、尿量減少シ、兩下肢陰囊ニ浮腫著明トナル。近來胸部壓迫感アリ、羸瘦甚シク、食慾睡眠不良ナリ。同年7月14日入院。身長、體格中等度榮養不良。皮膚及ビ可視粘膜ニ輕度ノ黄疸アリ。胸部左側ハ萎縮シ、呼吸運動充分ナラズ。心尖搏動ハ左側前腋高線第4肋間ニ觸ル。左側前後兩面共ニ全體ニ抵抗アリ呼吸音微弱、殊ニ背面下側方部ハ全ク濁音ヲ呈シ、呼吸音ヲ聴取シ得ズ。腹部ハ著シク膨隆シ腹水ヲ證明ス。肝、脾、腎共ニ觸レズ。下肢ニ高度ノ浮腫アリ。

膝蓋腱反射低下ス。

尿ハ酸性、Gmelin, Hay 陽性、沈渣ニ少許ノ「リボイド」ヲ認ム。血液所見ニ貧血及ビ Eosinophilie アリ。血清ワ氏反應陰性、高田氏反應陽性「ビリルビン」ハ H. van den Bergh 氏直接反應迅速、間接反應ニテ 3.85 mg %ヲ算ス。血液總「ヒヨレステリン」ハ 0.130 g %ニシテ「エステル」比率ハ 30.7 %ナリ。糖同化試驗成績ハ機能低下ヲ示ス。胸腔穿刺液ハ黃褐色、漿液性、比重 1.019、Rivalta 陽性、蛋白 7 %、肉眼のニモ鏡檢的ニモ Cholesterin 結晶ヲ認メ、化學的ニ遊離 Cholesterin ヲ分離セリ (0.155%)。腹腔穿刺液ハ黃色、比重 1.014、Rivalta 陰性、蛋白 2 %ニシテ漏出液ナリ。鏡檢上 Cholesterin 結晶ヲ認メズ。

(長大 楠井抄)

會報並ニ雜報

第十六卷第一號 島崎・櫃田論文正誤表

頁	場所	行	誤	正
7	歐文抄録	4	Takunari	Takanari
"	"	5	Die Yoshida'sche Reaktion (Y-R), eine Erscheinung, mit deren Hiefe Dr. Yoshida im Jahre 1930 eine neu von ihm erfundene, spezifische Tuberkulosedagnostik, aufstellt, ist eine auf diesem gebiete lange erwartete, ganz wundervolle Errungenschaft.	Die Yoshida'sche Reaktion (Y-R), eine im Jahre 1930 von Dr. Yoshida neu erfundene, spezifische Tuberkulosediagnose, stellt eine auf diesem Gebiete lange erwartete, ganz wundervolle Errungenschaft dar.
"	"	12	geprüftrn	geprüften
"	"	26	oder	der
72	本文	45	勿倫	勿論
"	"	48	結核	肺結核
74	第2表	10	4.8	48
"	本文	26	強陽性者、毎年同様	強陽性者ハ毎年同様
75	本文	39	過敏症	過敏度
76	本文	16	迄モナイ。重症ナルモノ程	迄モナク、重症ナルモノ程
77	文獻	25	Briegelen	Birgelen
"	"	31	Schmerzen	Schmerzer
"	"	36	Brit, T. Tbc.	Brit, J. Tbc.