原 著

新リファマイシン系薬剤 KRM-1648 の *in vitro* 抗結核菌作用

佐藤 勝昌・富岡 治明

島根医大微生物・免疫学

斎藤 肇

国立多摩研究所

河原 伸

国立療養所南岡山病院

日高 隆義

鐘淵化学工業生化研

受付 平成8年4月10日

受理 平成8年5月24日

IN VITRO ACTIVITIES OF THE BENZOXAZINORIFAMYCIN KRM-1648
AGAINST MYCOBACTERIUM TUBERCULOSISKatsumasa SATO*, Haruaki TOMIOKA, Hajime SAITO, Shin KAWAHARA
and Takayoshi HIDAHA

(Received 4 October 1996/Accepted 24 May 1996)

In vitro antimicrobial activities of the benzoxazinorifamycin derivative KRM-1648 (KRM) against 50 strains of *Mycobacterium tuberculosis* isolated from patients with mainly intractable pulmonary tuberculosis were studied. MIC₉₀ values of KRM, rifabutin (RBT) and rifampicin (RFP) for RFP-sensitive strains (27 strains; defined as those with MIC_{RFP} values of <1.56 μg/ml) were 0.013, 0.1 and 0.4 μg/ml, respectively, when determined by the agar dilution method using 7H11 medium. MIC₉₀ values of KRM, RBT, and RFP for RFP-resistant strains (23 strains; defined as those having MIC_{RFP} values of ≥1.56 μg/ml) were 100, 12.5 and >100 μg/ml, respectively. MICs of KRM against 50 clinical isolates of *M. tuberculosis* distributed over a much lower range than those of RFP. KRM showed more potent antimicrobial activity than RBT against the organisms with low MIC values (≤1.56 μg/ml), while it was not so active as RBT against the organisms with high MIC values (≥3.13 μg/ml). Cross-resistance between KRM and RFP or RBT was observed for *M. tuberculosis*.

* From the Department of Microbiology and Immunology, Shimane Medical University, Izumo, Shimane 693 Japan.

Key words : *Mycobacterium tuberculosis*, KRM-1648, Cross-resistance

キーワードズ : *Mycobacterium tuberculosis*, KRM-1648, 交差耐性

はじめに

先にわれわれは、結核菌をはじめとする諸種抗酸菌に対してベンゾキサジノリファマイシン系誘導体 KRM-1648 (KRM) が rifampicin (RFP) よりも強い *in vitro* 抗菌活性を有すること¹⁾²⁾、これは RFP よりも優れた菌体内への透過性に基づく RNA ポリメラーゼ活性の阻害によるものであること³⁾、*Mycobacterium marinum*, *M. avium*, *M. intracellulare*, *M. tuberculosis* および *M. leprae* のマウスあるいはウサギ感染モデル系において優れた治療効果を有することについて報告してきた^{4)~14)}。同様な検討は他の研究者によっても行われ、KRM は RFP などと比較して強い抗菌活性を有することが報告されている^{15)~21)}。

KRM は RFP あるいは rifabutin (RBT) と同様なリファマイシン誘導体であることから、これら薬剤間には交差耐性の存在が考えられる。そこで、今回は主として長期排菌患者より分離された結核菌に対する、新リファマイシン誘導体である KRM の *in vitro* 抗菌活性を 7H11 寒天平板希釈法で測定するとともに、KRM が他のリファマイシン誘導体との間にどの程度の交差耐性を有するのかについて検討した。

材料と方法

(1) 供試菌

国療広島病院、国療松江病院、国療南岡山病院および大阪府立羽曳野病院で分離・継代された主として長期排菌患者喀痰よりの結核菌計50株（臨床分離株50株）の他に、教室保存の結核菌 H₃₇R_v 株ならびに結核予防会結核研究所より分与を受けた同 Kuroko 株を併せ用いた。

(2) 薬剤

RFP (第一製薬, 東京), RBT (Farmitalia Carlo Erba, ミラノ), KRM (鐘淵化学工業, 兵庫), INH (和光純薬, 大阪), ethambutol (EB: 第一製薬, 東京), streptomycin (SM: 明治製薬, 東京), ofloxacin (OFLX: 第一製薬, 東京) および sparfloxacin (SPFX: 大日本製薬, 東京) を用いた。各薬剤は10mg/ml の濃度になるように、リファマイシン系薬剤は dimethyl sulfoxide に、キノロン系薬剤は 0.1N NaOH に、またその他の薬剤は蒸留水に溶解したのち供試した。

(3) MIC 測定法

供試薬剤 (100~0.0008 μg/ml) の2倍階段希釈液を含有する 7H11 寒天平板上に、7H9 broth (Difco) 中で OD_{540nm} = 0.1 になるまで 37°C で培養した菌液の 0.1% Tween 80 水による 5 倍希釈液 (約 10⁶ CFU/ml) の 5 μl をマイクロプランター (佐久間製作所, 東京) でスポットし、37°C, 5% CO₂ 環境下で 2 週培養後に MIC を判定した²²⁾。

結果

結核菌に対する RFP の *in vitro* 感受性試験とその臨床応答性との関係から決定された break point としては、小川培地を用いて得られた場合では 50 μg/ml²³⁾ が、7H11 寒天培地を用いた場合では 1 μg/ml²⁴⁾ が提唱されている。そこで、今回は結核菌に対する RFP の MIC 値が 1.56 μg/ml 以上のものを RFP 耐性株と定義した。Table 1 はその定義に従って、得られた RFP の MIC 値より臨床分離株 50 株を RFP 感受性株並びに耐性株に分類し、各薬剤の結核菌に対する MIC 値を示したものである。まず、RFP 感受性株の場合には、RFP

Table 1 MICs of KRM, RBT, and RFP for 50 clinical isolates of *M. tuberculosis*^{a)}

Drugs	MIC (μg/ml)					
	Clinical isolate				Reference strains	
	RFP-sensitive (27 strains)		RFP-resistant (23 strains)		H ₃₇ R _v	Kuroko
	MIC ₅₀	MIC ₉₀	MIC ₅₀	MIC ₉₀		
KRM	0.006	0.013	6.25	100	0.013	0.006
RBT	0.013	0.1	3.13	12.5	0.025	0.013
RFP	0.1	0.4	>100	>100	0.1	0.1

a) MIC were determined by the agar dilution method using 7H11 medium.

Fig. 1 Distribution of MICs of KRM and RFP for 50 clinical isolates of *M. tuberculosis*. (A): Susceptibility distribution of the isolates to KRM (solid line) and RFP (dashed line). (B): Correlation between MICs of KRM and those of RFP for the isolates. MICs were determined by the agar dilution method using 7H11 medium.

のMIC₅₀とMIC₉₀はそれぞれ0.1および0.4 μg/mlであったのに対して、KRMではそれぞれ0.006並びに0.013 μg/mlで、RFPのそれらの1/16～1/32、またRBTのそれらの1/2～1/8であった。他方、RFP耐性株の場合では、KRMのMIC₅₀並びにMIC₉₀(各6.25および100 μg/ml)はRFPのそれら(ともに>100 μg/ml)よりも低かったが、RBTのそれらよりも2～8倍高かった(各3.13および12.5 μg/ml)。

Fig. 1はTable 1に示した臨床分離株50株に対するRFPおよびKRMのMICの分布(A)並びにMICの相関(B)を示したものである。Fig. 1-Aより明らかなようにKRMのMIC値はRFPのそれに比べて低値側にシフトしており、MICのピーク値はKRMの0.006 μg/mlであったのに対して、RFPでは0.1 μg/mlであった。また、Fig. 1-Bから分かるようにKRMとRFPの間には交差耐性が見られたが、KRMの各被検菌に対するMICは、いずれもRFPのそれよりも低値側に分布していた。

Fig. 2はKRMとRBTについて、Fig. 1に示した

と同様の分析法による結果を示したものである。Fig. 2-Aに示したようにKRMとRBTの各MIC分布間には顕著な差はみられず、KRMおよびRBTのMICのピーク値はそれぞれ0.006および0.013 μg/mlであり、わずかな違いがみられたに過ぎなかった。また、Fig. 2-Bに示したようにKRMとRBTの間には交差耐性が認められたが、この場合RBTのMICが1.56 μg/ml以下の場合ではKRMのMICはそれよりも常に低値側に分布したのに対して、RBTのMICが3.13 μg/ml以上の場合にはKRMのMICはそれとほぼ同等か、あるいはむしろそれよりも高値側に分布する場合が多くみられた。

Table 2にはKRM、RBTおよびRFP%に対して感受性を異にする臨床分離株(Fujii, Kurata, Watanabe)並びに結核菌保存株(H37 Rv, Kurono)に対する諸種抗菌剤のMICを示した。供試株数は少ないがKRMとINH、EB、SMおよびニューキノロン剤(OFLX, SPFX)の間には交差耐性は認められないことが分かった。

Fig. 2 Distribution of MICs of KRM and RBT for 50 clinical isolates of *M. tuberculosis*. (A) : Susceptibility distribution of the isolates to KRM (solid line) and RBT (dashed line). (B) : Correlation between MICs of KRM and those of RBT for the isolates. MICs were determined by the agar dilution method using 7H11 medium.

考 察

KRM の *in vitro* 抗菌活性についてはすでに Kirchner 液体培地を用いての山本らの報告¹⁵⁾あるいは BAC-TEC 460 TB System を用いての Luna-Herrera

ら¹⁷⁾とわれわれの報告¹⁴⁾がみられ、いずれも KRM が RFP よりも著しく優れたものであることが示されているが、今回のわれわれの 7H11 寒天培地を用いての検討でも、RFP 感受性菌並びに RFP 耐性菌を問わず、これらの知見を追認することができた。次に KRM の抗

Table 2 MICs of various drugs for reference strains and some clinical isolates of *M. tuberculosis*^{a)}

Strain	MIC ($\mu\text{g/ml}$)							
	KRM	RBT	RFP	INH	EB	SM	OFLX	SPFX
Clinical isolates								
Fujii	0.006	0.013	0.05	0.4	3.13	>100	0.8	0.2
Kurata	0.1	0.1	12.5	12.5	6.25	3.13	6.25	1.56
Watanabe	100	12.5	>100	12.5	12.5	>100	12.5	3.13
Reference strains								
H37 Rv	0.013	0.025	0.1	0.05	3.13	0.8	0.8	0.2
Kurono	0.006	0.013	0.1	0.1	6.25	0.8	0.8	0.2

a) MICs were determined by the agar dilution method using 7H11 medium.

結核菌活性を RBT と比較した場合、KRM の MIC が $1.56 \mu\text{g/ml}$ 以下の菌株における KRM の抗菌活性は RBT よりも優れたものであったが、KRM の MIC が $3.13 \mu\text{g/ml}$ 以上の菌株に対してはこれとは逆に RBT の方が KRM よりも優れた抗菌力を示すという成績が得られた。その理由については明らかでないが、 $25 \mu\text{g/ml}$ 以上の KRM 含有 7H11 寒天培地では、培養経過中に培地中に約 0.05mm の針状突起を有する KRM の結晶が生じてくることを見ていることから、これよりもさらに低濃度域においても微細な結晶が析出している可能性もありうると考えている。したがって、KRM に対して $3.13 \mu\text{g/ml}$ 以上の MIC を示す菌では真の MIC はこのような見かけ上の値よりもさらに小さくなる可能性が十分考えられる。このような KRM の高濃度域における針状結晶生成現象は 7H12B 培地を用いた BACTEC 法での MIC 測定の場合にもみられたが、高濃度域での KRM と RBT の MIC の逆転現象はみられなかった。その理由として、BACTEC 法での MIC 測定では、培養期間が数日と短いこと、また測定 MIC 値自体も 7H11 寒天希釈法に比べて比較的低いことによるかもしれない。

先にわれわれは、結核菌に対しては KRM と RFP あるいは RBT との間には交差耐性がみられることについて報告¹⁴⁾したが、今回の検討でも同様の知見が得られた。このことよりすると、RFP 高度耐性菌には KRM の抗菌活性は期待し得ないもののように思われる。しかしながら、供試いずれの結核菌株に対しても KRM の MIC は RFP のそれよりも常に低く、RFP 感受性菌のみならず、軽度耐性菌にたいしてもその抗菌力が期待できるものと思われる。

先に、久世らのグループ¹⁶⁾¹⁹⁾は、結核菌 H₃₇R_v 株感染マウスに対して、KRM は RFP よりも優れた延命効果をもたらしたと報告している。われわれも KRM (MIC= $0.006 \mu\text{g/ml}$) および RFP (MIC= $0.1 \mu\text{g/ml}$) 感受性の結核菌を感染させたマウスを、これらの各薬剤で治療し、その効果を比較検討したところ¹⁴⁾、久世らの報告と同様の知見を得ることができた。さらにわれわれの RFP 耐性結核菌感染マウスに対する KRM の治療効果についての検討¹⁴⁾では、RFP $25 \mu\text{g/ml}$ 耐性株 (Kurata 株) 感染マウスの場合、RFP の 0.4mg 投与は無効であったが、同じ量の KRM (MIC= $0.1 \mu\text{g/ml}$) 投与では有意な治療効果を認めている。しかし、RFP $\geq 100 \mu\text{g/ml}$ の MIC を示す耐性結核菌 5 菌株の各感染マウスに対する KRM の治療効果は、KRM の MIC 値が $0.1 \sim 0.8 \mu\text{g/ml}$ と十分に低い菌株による感染の場合でも、上述の用量では全く効果はみられなかった¹⁴⁾。

これらのことより、7H11 寒天培地を用いて測定された結核菌に対する KRM の $0.1 \mu\text{g/ml}$ を実験的マウス

結核症に対する有効性評価の一つの目安の濃度と考えるとよいのではなかろうかと思われる。しかしながら、ヒトとマウスでは薬剤の体内動態が異なることから、この値をもって直ちにヒトに置き換えて考えることはできない。今後、KRM の臨床適用において本剤の臨床上で有用性を予測することができるような本剤の結核菌に対する MIC 値を決定すること、あるいは他の何らかのシステムの開発が必要と思われる。これは結核菌のみならず *M. avium* complex についても同様であると考えられる。

結 語

主として長期排菌結核患者より分離された結核菌 50 株に対する KRM-1648 (KRM)、rifampicin (RFP) および rifabutin (RBT) の MIC を 7H11 寒天平板を用いて測定し、以下の知見を得た。

- 1) KRM の抗菌活性は RFP より優れ、RBT とほぼ同等か若干優れているようであった。
- 2) KRM は RFP 並びに RBT と交差耐性を示したが、KRM の MIC は、特に RFP のそれよりもいずれも低値に分布した。

文 献

- 1) Saito H, Tomioka H, Sato K, et al.: In vitro antimycobacterial activities of newly synthesized benzoxazinorifamycins. *Antimicrob Agents Chemother.* 1991; 35: 542-547.
- 2) Tomioka H, Saito H, Fujii K, et al.: In vitro antimicrobial activity of benzoxazinorifamycin, KRM-1648, against *Mycobacterium avium* complex, determined by the radiometric method. *Antimicrob Agents Chemother.* 1993; 37: 67-70.
- 3) Fujii K, Saito H, Tomioka H, et al.: Mechanisms of action of antimycobacterial activity of the benzoxazinorifamycin KRM-1648. *Antimicrob Agents Chemother.* 1995; 39: 1489-1492.
- 4) Tomioka H, Saito H, Sato K, et al.: Chemotherapeutic efficacy of a newly synthesized benzoxazinorifamycin, KRM-1648, against *Mycobacterium avium* complex infection induced in mice. *Antimicrob Agents Chemother.* 1992; 36: 387-393.
- 5) Yamamoto Y, Saito H, Tomioka H, et al.: In vitro and in vivo activities of KRM-1648, a newly synthesized benzoxazinorifamycin,

- against *Mycobacterium marium*. Zbl Bakt. 1992; 277: 204-209.
- 6) Tomioka H, Saito H, and Hidaka T: In vivo antileprosy activity of the newly synthesized benzoxazinorifamycin, KRM-1648. Int J Lepr. 1993; 61: 255-258.
 - 7) 富岡治明, 佐藤勝昌, 斎藤 肇, 他: *Mycobacterium intracellulare* 感染マウスに対するベンゾキサジノリファマイシン系薬剤 KRM-1648 の効果-治療開始時期の検討-. 結核. 1993; 68: 631-635.
 - 8) 富岡治明, 佐藤勝昌, 斎藤 肇, 他: *Mycobacterium intracellulare* 感染マウスに対するベンゾキサジノリファマイシン系薬剤 KRM-1648 の効果-投与回数の検討-. 結核. 1993; 68: 683-686.
 - 9) 富岡治明, 佐藤勝昌, 斎藤 肇, 他: *Mycobacterium intracellulare* 感染マウスに対するベンゾキサジノリファマイシン系薬剤 KRM-1648 と宿主免疫賦活剤 LC9018 の併用治療効果. 結核. 1993; 68: 751-754.
 - 10) Emori M, Saito H, Sato K, et al.: Therapeutic efficacy of a benzoxazinorifamycin, KRM-1648, against experimental *Mycobacterium avium* infection induced in rabbits. Antimicrob Agents Chemother. 1993; 37: 722-728.
 - 11) 斎藤 肇, 富岡治明, 佐藤勝昌, 他: *Mycobacterium intracellulare* 感染マウスに対するベンゾキサジノリファマイシン系薬剤 KRM-1648 の長期治療. 結核. 1994. 69: 59-63.
 - 12) Saito H, Tomioka H, Sato K, et al.: Therapeutic efficacy of benzoxazinorifamycin, KRM-1648, in combination with other antimicrobials against *Mycobacterium leprae* infection induced in mice. Int J Lepr. 1994; 62: 43-47.
 - 13) Saito H, Tomioka H, Sato K, et al.: Therapeutic effect of KRM-1648 with various antimicrobials against *Mycobacterium avium* complex infection in mice. Antimicrob Agents Chemother. 1995; 76: 51-58.
 - 14) Hirata T, Saito H, Tomioka H, et al.: In vitro and in vivo activities of the benzoxazinorifamycin KRM-1648 against *Mycobacterium tuberculosis*. Antimicrob Agents Chemother. 1995; 39: 2295-2303.
 - 15) 山本 誉, 網谷良一, 久世文幸, 他: 新 rifamycin 誘導体の *Mycobacterium tuberculosis* と *M. avium* complex に対する *in vitro* 抗菌作用. 結核. 1990; 65: 805-810.
 - 16) 久世文幸, 山本 誉, 網谷良一, 他: 新 rifamycin 誘導体の *Mycobacterium tuberculosis* と *M. avium* complex に対する *in vivo* 活性. 結核. 1991; 66: 7-12.
 - 17) Luna-Herrera J, Reddy MV, and Gangadharan PRJ: In vitro activity of the benzoxazinorifamycin KRM-1648 against drug-susceptible and multidrugresistant tubercle bacilli. Antimicrob Agents Chemother. 1995; 39: 440-444.
 - 18) Klemens SP, and Cynamon MH: Activity of KRM-1648 in combination with isoniazid against *Mycobacterium tuberculosis* in a murine model. Antimicrob Agents Chemother. 1996; 40: 298-301.
 - 19) Yamamoto T, Amitani R, Suzuki K, et al.: In vitro bactericidal and in vivo therapeutic activities of a new rifamycin derivative, KRM-1648, against *Mycobacterium tuberculosis*. Antimicrob Agents Chemother. 1996; 40: 426-428.
 - 20) Yamamoto T, Amitani R, Suzuki K, et al.: Activity of KRM-1648 alone or in combination with both ethambutol and kanamycin or clarithromycin against *Mycobacterium intracellulare* infections in beige mice. Antimicrob Agents Chemother. 1996; 40: 429-432.
 - 21) Ji B, Lounis N, Truffot-Pernot C, and Grosset J.: How effective is KRM-1648 in treatment of disseminated *Mycobacterium avium* complex infections in beige mice? Antimicrob Agents Chemother. 1996; 40: 437-442.
 - 22) 佐藤勝昌, 斎藤 肇, 富岡治明: Rifabutin 並びに Rifampicin の 7H10 寒天培地並びに小川培地における抗マイコバクテリア活性の比較. 結核. 1988; 63: 601-604.
 - 23) 日本結核病学会治療専門委員会: 結核化学療法に関する見解. 結核. 1974; 49: 349-356.
 - 24) McClatchy JK: Susceptibility testing of mycobacteria. Lab. Med. 1978; 9: 47-52.